

Detección y atención precoces del estrés cardiaco y la insuficiencia cardiaca (IC) en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)




**Persona diabética
sin síntomas de IC**



Médico de
atención primaria



Endocrinólogo




Cardiólogo



Internista



Laboratorio



1. ¡Buscar activamente!




Estrés cardiaco = NT-proBNP




Síntomas de IC

**De inicio
Repetir en 2 años
(1 año si factores de riesgo)**



2. No síntomas + NT-proBNP <50 pg/ml = OK



3. No síntomas + NT-proBNP >50 pg/ml = Estrés cardiaco




<50 años: >75 pg/ml



50-74 años: >150 pg/ml



≥75 años: >300 pg/ml



Riesgo aumentado de IC

**Incidir medidas preventivas
Seguimiento cercano**




<50 años: >450 pg/ml



50-74 años: >900 pg/ml



≥75 años: >1800 pg/ml



Alta probabilidad de IC

**Ecocardiograma
Cardiología**

Un proyecto de:



Asociación de
Insuficiencia
Cardíaca

Con la colaboración de:



Documento clínico de posicionamiento para la
detección y la atención precoces del estrés cardiaco y la
insuficiencia cardiaca en personas con diabetes tipo 2.

